



登革熱

BIG NEWS

基孔肯雅熱

隨著夏季高溫多雨
蚊蟲進入活躍期
加上跨境人員流動增加
以致輸入本澳的風險上升
並帶來本地傳播的風險





登革熱

是由登革熱病毒引起的急性傳染病


潛伏期約4-10日



基孔肯雅熱


是由基孔肯雅病毒引起的急性傳染病
又稱屈公病

潛伏期約3-7日



兩者是通過白紋伊蚊或埃及伊蚊傳播的疾病
不會經由人與人之間傳播

本澳常見的白紋伊蚊可傳播這兩種疾病






基孔肯亞熱的臨床症狀



基孔肯亞熱的臨床症狀與登革熱類似

	登革熱	基孔肯亞熱
常見症狀	發熱	
	出疹	
	頭痛 肌肉及關節痛 後眼窩痛 (俗稱三痛)	關節痛 (腕關節、膝關節、踝關節、指關節等小關節)





預防三招



防止家居 "孳生" 蚊子

注意定期清除(至少每週一次)
工作地點和家居周圍環境的積水
杜絕蚊蟲孳生


防止蚊子 "進入" 室內

家中可使用紗窗、蚊帳或開冷氣
等措施，減少被蚊叮咬機會



防止戶外蚊子 "叮咬"

在戶外活動時穿淺色長袖衫褲
並在皮膚暴露地方或衣服
使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬





不適時請及時求醫



不論是否有外遊史，若有發熱、皮疹及劇烈關節疼痛（常見於手腕、膝蓋、腳踝及手指等小關節）等疑似基孔肯雅熱及登革熱的症狀，應及時就醫，並告知醫生有關的居住地點或旅遊史



不要亂吃藥



不確定成因時，不建議服用以下成份的藥物，可能會增加出血風險
阿司匹林(ASPIRIN)
布洛芬(IBUPROFEN)

需要時請向醫生查詢

